

تذكير مهم

إذا تمت جدولة موعد لزيارة عن بعد/افتراضية، ستصلك رسالة نصية أو بريد إلكتروني يوضح تاريخ ووقت زيارتك. ستلقى أيضاً إرشادات حول كيفية إعداد الكمبيوتر أو الجهاز المحمول لزيارتك.

ما المقصود بالقسطرة العصبية؟

تساعد القسطرة العصبية - والتي تسمى أيضاً قسطرة كتلة الأعصاب - في التحكم في الألم. يقوم الطبيب بحقن دواء مخدر (مخدر موضعي) قرب العصب لمنع الألم في موضع محدد من جسم طفلك. يحصل بعض الأطفال على تخدير جزئي للأعصاب المحيطية. يعني ذلك أن فقط بعض من موضع الجراحة سيكون مخدراً.



شاهد فيديو عن تخدير الأعصاب المحيطية، بإذن مستشفى سياتل للأطفال:

<https://bit.ly/seattlecath>، أو يمكنك

أيضاً مسح شيفرة الاستجابة السريعة بواسطة كاميرا هاتفك.

كيف سيشعر طفلي بعد خضوعه لتخدير الأعصاب المحيطية؟

قد يستيقظ طفلك ويكون الموضع المتأثر من جسمه، مثل الذراع أو الرجل، يشعر بالخدري.


يقول بعض الأطفال أنهم لا يمكنهم الشعور بقسم أو بكامل الجزء من جسدهم الذي تعرّض للتخدير أو تحريكه. ذلك أمر طبيعي.

كيف تقوم القسطرة العصبية بوظيفتها؟

العودة إلى المنزل بعد وضع القسطرة العصبية يسمح لدواء تخدير الألم (المخدر الموضعي) بالوصول مباشرة إلى موضع الألم لفترة ٧٢ ساعة (٣ أيام).

تُثَرِّق قسطرة (أنبوب بلاستيكي صغير) في موقع الأعصاب التي سيتم تخديرها. تعطى الأدوية عبر القسطرة من خلال مضخة مطاطية. تبدو المضخة كطابعة. يصغر حجم المضخة مع الوقت بينما تضخ الدواء على وتيرة محددة، ولكن قد لا تلاحظ ذلك.

تخدير الأعصاب المحيطية عن طريق التسريب المستمر



ما هي حسنات القسطرة العصبية؟

يؤدي وجود قسطرة أعصاب إلى تقليل كمية الألم التي يتم التعرض لها، وفي بعض الحالات يؤدي ذلك إلى إزالة الألم أثناء وجود القسطرة. بما أن الموضع يشعر بتخدير، فإن طفلك لن يحتاج إلى نفس القدر من الأدوية الأخرى لتخفيف الألم بعد الجراحة.

ما هي مخاطر القسطرة العصبية؟

- علامات السمية المحلية:
 - الدوار
 - طعم معدني في الفم
 - خدر حول الشفاه
 - رنين في الأذن
 - نوبات عصبية
 - القلق المفاجئ (الجزع) أو الخفقان (تسارع القلب أو ضربات القلب السريعة جداً)
- علامات العدوى في موضع غرز القسطرة
 - قيح
 - احمرار
 - تورم
 - ألم
- تغييرات أخرى مثل:
 - خروج القسطرة من مكانها
 - ارتفاع مفاجئ لمستوى الألم
 - احمرار، تورم أو قيح (نزح سائل) حول موضع القسطرة

إذا حصلت أي من تلك الأمور، أقلق الأنبوب بالمشبك واتصل بموظف البايجر في مستشفى بوسطن للأطفال على الرقم **6000-355 (617)** اطلب منه طلب الرقم **1128**.

ماذا يحدث عندما نعود إلى المنزل؟

تستمر القسطرة في ضخ الدواء بمفردها حتى تقوم بإفقال الأنبوب عبر المشبك. ستحصل على رسائل نصية في الأيام ١ و ٢ و ٣ و ٧ و ١٤ بعد وضع القسطرة وسيطلب منك الإجابة عن بعض الأسئلة. هذه الأسئلة مهمة وتساعدنا على معرفة كيف يتعافى طفلك.

كيف يمكنني العناية بطفلي في المنزل؟

العناية بالمشبك والأنبوب

- تحقق من أن المشبك على القسطرة كلها مفتوحة.
- تأكد من أن كل التوصيلات مشدودة وأن الأنبوب ليس ملتويًا أو معقوداً.
 - إذا انفصل الأنبوب، قم بلّفه بمسحة كحول نظيفة، أقلقه بالمشبك، واتصل بنا.

العناية بالضمادة

- إذا خضع طفلك للجراحة، أبقِ الضمادات حول موضع الجراحة جافة ونظيفة.
- لا تدع طفلك يستحم بينما لا تزال القسطرة موضوعة. يمكن أن تستحم طفلك باستخدام الإسفنج فقط ولكن أبقِ موضع الضمادات جافاً.
- قد يكون هناك نزح من موضع غرز القسطرة حيث مكان الضمادة الشفافة. إذا حصل ذلك، قم بإضافة الضمادات (تيداديم) والصقها على الموضع.

العناية بالمضخة

- أبقِ الموصفات على المضخة والأنابيب.
- أبقِ المضخة في علبيتها وبعيداً عن المغلفات الباردة أو الساخنة.

العناية بالأماكن المخدرة من الجسم

- إحم الأجزاء المخدرة من جسم طفلك من الإصابات بما أنه لن يشعر بها كالعادة.
- استخدم علاجات التندفة والتبريد كما هو موصوف. قم بلف أي حزمة حرارية بقطعة قماش مثل غطاء وسادة بحيث لا تكون على البشرة مباشرة.

رعاية ما بعد جراحة الرجل مع القسطرة

لا ينبغي على طفلك وضع أي ثقل على رجله إلى حين إخراج القسطرة وزوال مفعول تخدير الأعصاب.

رعاية ما بعد جراحة الذراع مع القسطرة

- أبق ذراع طفلك في رباط بينما القسطرة في مكانها.

متى تستخرج القسطرة؟

ستستخرج القسطرة أثناء الزيارة الطبية عن بعد الخاصة بك.

زيارة الرعاية الصحية عن بُعد للاستخراج:

تاريخ/وقت:

اتصل بموعد الرعاية عن بُعد قبل ١٠ دقائق على الأقل من الوقت المذكور أعلاه.

كيف أستعد للزيارة الطبية عن بعد؟

للتحضير للزيارة الطبية عن بعد، اتبع الإرشادات أدناه:

- قم بإقفال الأبواب بالمشبك في الساعة ٩ صباحاً، يوم الزيارة الطبية عن بُعد. هذا أمر مهم.
- تحقق من بريدك الإلكتروني للحصول على معلومات حول الزيارة. إذا لم تكن هذه المعلومات موجودة في علبة الوارد، فتتحقق من ملف البريد العشوائي/غير الهام. اتصل بنا إذا كانت لديك أسئلة حول الموعد 355-7040 (617).
- شاهد هذا الفيديو وراجع الخطوات أدناه باذن من مستشفى سياتل للأطفال: <http://bit.ly/seattlecathremoval>. أو يمكنك أيضاً مسح شيفرة الاستجابة السريعة بواسطة كاميرا هاتفك.
- اتصل بموعد الرعاية قبل ١٠ دقائق على الأقل من الوقت المذكور أعلاه.
- اغسل يديك واعررض اللوازم التي أعطيت لك عندما غادرت المستشفى.
- ابدأ بإزالة الضمادة اللاصقة قبل ١٠ دقائق من الموعد. افتح المزيل اللاصق وأزل ببطء الضمادات بينما تسمح المزيل اللاصق بين الضمادات والجلد.
- عندما ينضم الموفر إلى الزيارة الطبية عن بعد، ضع القفاصات التي يمكن التخلص منها في حقيبة المستلزمات. اسحب القسطرة ببطء حتى تستخرجها بالكامل. إذا بدا أن القسطرة عالقة أو إذا أحسن طفلك بألم شديد، توقف عن السحب فوراً وأبلغ موفر الرعاية.
- بعد سحب القسطرة، استخدم الشاش لتجفيف أي نزح أو دم. ثم ضع عليها لاصق باند-أيد.
- تخلص من القسطرة والضمادة المستخدمة والمضخة في مكان آمن للتأكد من أن الأطفال أو الحيوانات الأليفة لن تاكل أي أدوية متبقية.

اتصل بنا

للاتصال بنا في أي وقت (نهاراً أو ليلاً)، بما في ذلك العطلات وعطلات نهاية الأسبوع، يرجى:

- اتصل بموظف البايجر في مستشفى بوسطن للأطفال على الرقم 617-355-6000 وإطلب منه الاتصال بالرقم 1.128. وهذا أمر مهم للغاية، لذا سيفهم الطبيب المناوب لبرنامج BHAPPY بالاتصال بك مرة أخرى.